

Cette correction **non exhaustive** se base sur les réponses apportées par les candidats et également sur quelques compléments du jury.

Aesculus hippocastanum

Port dense. Grandes feuilles palmées. Fleurs blanches parfumées. Semis. Alignement. La mineuse du marronnier.

Skimmia japonica

Asie. Plante acidophile. Floraison blanc rose pâle, parfumé. Mi-ombre, ombre. Sol acide. Massif de terre de bruyère.

***Choisya ternata* ‘Sundance’ (‘Lich’ SUNDANCE)**

Floraison blanche, parfumée. Remontée de floraison en fin d’été. Bouturage. Supporte l’ombre. Sol neutre à acide. Rusticité – 10° C. En massifs, haies variées. Craint le phytophthora.

***Cornus sericea* (*Stolonifera*) ‘Flaviramea’**

Touffe dressée. Plante stolonifère. Bois remarquable jaune en hiver. Bouturage. Soleil, mi-ombre. Aime les sols frais. Haies, massifs.

***Actinidia deliciosa* (*chinensis*)**

Chine. Dioïque. Sujets mâles et femelles. Sujets auto-fertiles. Plante exubérante/peut devenir envahissante. Craint les climats froids. Pergolas.

Oenothera* (*Gaura*) *lindheimeri

Vivace de longue floraison. Fleurs blanc, rose. Division. Supporte les terrains secs. Massifs. Taille, rabattre au printemps.

Muehlenbeckia complexa

Nouvelle-Zélande. Couvre-sol, rampant, retombant, grimpant. Bouturage, marcottage. Soleil, mi-ombre, ombre. Compositions. Fleuristerie.

Borago officinalis

Annuelle. Fleurs violettes. Semis, division. Plante comestible. Plante médicinale.

Dieffenbachia seguine

Plante d’intérieur, d’appartement. Plante toxique. Sève (latex) irritante. Sol neutre à acide. Sol drainant.

Euphorbia pulcherrima

Mexique. Plante d’intérieur. Fleurs bractées colorées. Produit un latex. Bouturage. Photopériodisme. Plante vendue pour les fêtes (Noël).